

# ENFERMEDAD DE MONDOR: PATOLOGIA INFRECUENTE O SUBDIAGNOSTICADA? PRESENTACION DE UN CASO

Castagnetto, L. G. ; Rodriguez Varela, R.B.; Garabento, M. G.

**Introducción:** Flebitis fibrosa, trombosis venosa superficial en pared torácica descrita por Mondor en 1939, se caracteriza por cuerda fibrosa palpable y sin inflamación en piel circundante. Presentación clínica constante a pesar de varias etiologías propuestas. Rara en miembro superior.

**Material y método:** Mujer de 30 años con dolor repentino en codo izquierdo y cuerda palpable sin inflamación. Estudios de imágenes sin hallazgos positivos. Se hallaron 425 artículos sobre flebitis cordonal en Pubmed, solo 2 detallaban ubicación en segmentos específicos del miembro superior.



**Resultado:** La paciente tuvo remisión total de signos y síntomas en 4 semanas, sin recurrencia a los 6 meses. Quick DASH de 0% y una puntuación de 100 de MEPS.

**Conclusión:** En este caso, se cuestiona si las manifestaciones son atípicas o más comunes de lo conocido, debido a su naturaleza benigna y a menudo asintomática. Hay poca información científica disponible sobre el diagnóstico y tratamiento de este tipo de presentaciones.